

Contactpersonen:

hooilandjes

Richard Janzen tel: 06-81758445

rwjanzen@hotmail.nl

km-hokken

Renske Roest tel. 06-10194994 renske_roest@hotmail.com

1 Dominee Abernathylaan

Verzamelaars: Bij de Nedal aluminiumfabriek hoek Groenewoudsedijk en fietspad Dominee Abernathylaan

Datum en tijd: Zaterdag 20 juni 9.30 ca. 13.30 uur

De Dominee Abernathylaan is het fietspad van De Meernbrug naar de Groenewoudsedijk om de aluminiumfabriek van NEDAL. De berm bestaat uit voedselarm zand. Het hooilandje wordt begraasd door konijnen die in de helling met dicht bramenstruweel een goede schuilplaats hebben. Grassen zijn laag en veel minder dominant dan in andere hooilandjes. Verschillende gele composieten leer je hier goed herkennen.

Komen de gewenste aandachtsoorten die hieronder zijn beschreven nog voor?

Graag aanmelden i.v.m. koffie, thee en koekjes.

Beschrijving van de aandachtsoorten van de Abernathylaan.

Bijenorchis - *Ophrys apifera*

Afmeting: 20-50 cm.

Bloemen: Tweeslachtig (een bloem met zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtsorganen). De bloemen zijn 1-1,3 cm en groeien met twee tot elf bijeen in slanke, losse aren. De buitenste bloemdekbladen zijn wit, roze of roodachtig. De lip is drielobbig, donkerpurper met gele tekeningen, aan de voet van de middenlob met twee kleine glanzende uitsteeksels, aan de top met een naar achteren gericht aanhangseltje en met teruggebogen, van onderen samen neigende, behaarde zijlobben. De binnenste schildvormige bloemdekbladen zijn groen of roodachtig en behaard.



Duits viltkruid - *Filago vulgaris*

Afmeting: 10-40 cm.

Bloeimaanden: Juli, augustus en september.

Stengel: De rechtopstaande of iets afstaande stengels zijn onderaan meestal niet vertakt. Ze zijn grijswit viltig behaard. Forse exemplaren hebben meerdere stengels. Ze hebben vaak een gaffelvormige bouw. De stengels eindigen in een kluwen met veel hoofdjes.

Bladeren: Eerst vormt de jonge plant een rozet, die kan overwinteren. De verspreidstaande langwerpige tot lijnvormige bladeren hebben de grootste breedte onder het midden. De nerv is goed zichtbaar aan de bladonderkant. Ze zijn naar de voet niet versmald en vaak iets golvend. Vlak onder de wit behaarde hoofdjeskluwens zitten geen bladeren die opvallend buiten de kluwens uitsteken



Bloemen: Polygaam. De gele bloemhoofdjes zitten met dertien tot dertig bij elkaar in dichte bolronde, wit behaarde kluwens van 1-4 cm. De meeste buisbloemen zijn vrouwelijk. Alleen in het

midden van een hoofdje zitten enkele tweeslachtige, viertallige buisbloemen. Het omwindsel is zwak vijfkantig. De omwindselbladen zijn geel met een rechte top en met iets onder het midden een halvemaaanvormige rode vlek.

Frans walstro - *Galium parisiense*

Hoofdbloei: Juni t/m augustus.

Afmeting: 15-20 cm.

Stengels: Een slappe, liggende stengel, die soms omhoog groeit, steunend op andere nabije planten. De stengel is meestal sterk vertakt is en is over de gehele lengte ruw door rugwaarts-gerichte stekels.

Bladeren: De kleine, lijn-lancetvormige bladen staan in kransen van zes (soms vier of vijf). Ze zijn spoedig teruggeslagen. Verder zijn ze stekelpuntig en eennervig. De bladrand heeft naar voren gerichte stekelhaartjes.

Bloemen: Tweeslachtig. De bloeiwijzestelen zijn langer dan de bloemstelen en de bloemen steken voorbij de schutbladen. De groenwitte of groenachtig gele, van buiten enigszins roodachtige, 0,5-1 mm grote bloemen groeien zowel in korte okselstandige, gesteelde bijschermen als in een eindstandige pluim.



Heelblaadjes - *Pulicaria dysenterica*

Afmeting: 60-90 cm.

Stengels: De behaarde stengels staan stijf rechtop en zijn meestal strobruin. Ze zijn alleen in de bovenste helft vertakt. Heelblaadjes groeit in groepen.

Bloemen: De bloemhoofdjes zitten, aan de top de stengels en vertakkingen, in losse iets schermvormige pluimen. De hoofdjes zijn 1½ -2½ cm. De gele lintbloemen staan horizontaal af. Ze zijn twee keer zo lang als het groene, beklierde omwindsel. De buisbloemen zijn dooiergeel. De omwindselbladen zijn lijnvormig en viltig.



Glad walstro *Galium mollugo*

De stengels zijn weinig of niet behaard, vierkantig en glad. Vlak onder de bladkransen zijn ze vaak verdikt. Meestal liggen de stengels op de grond, soms zijn ze opstijgend of ze klimmen.

De lichtgroene, gewoonlijk in kransen van zes tot acht groeiende bladeren zijn langwerpig tot omgekeerd eirond, dun en hebben één nerf. Ze zijn 2-8 mm breed. De bladrand is meestal niet omgerold en vaak kaal. Bij de bladtop groeien stekelhaartjes.



Hazenpootje - *Trifolium arvense*

Afmeningen: 5-30 cm hoog.

Boeimaanden: juni t/m november.

Stengel: Rechtopstaande of soms bijna liggende stengels zijn sterk vertakt en dicht grijsviltig behaard.

Bladeren: Voor de bloei zijn de drie deelblaadjes meestal matig behaard en sterk wijnrood aangelopen. De bladen hebben omgekeerd hartvormige tot langwerpige deelblaadjes. Tijdens de bloei worden de blaadjes dicht grijsviltig. De onderste bladen sterven dan af. De later gevormde bladen hebben langwerpige deelblaadjes.

De sterk behaarde, iets cilindervormige, wit of roze bloeiwijzen staan op lange stelen in de bladoksels en aan de top van de stengels.

Groeiplaats: Op zonnige, vaak vrij open plaatsen op droge grond. Je kunt de plant o.a. aantreffen langs akkers, in bermen, op spoorwegterreinen en op opgespoten grond.

Hazenpootje komt oorspronkelijk uit Europa, West-Azië en Noord-Afrika.

Bij ons is dit plantje (vrij) algemeen.



Vierzadige wikke - *Vicia tetrasperma*

Undersoorten: Vierzadige wikke (subsp. *tetrasperma*) en Slanke wikke (subsp. *gracilis*).

Afmeningen: 15-70 cm hoog

Bloeimaanden: mei t/m augustus

Stengel: Vrijwel kale stengels.

Bladeren: Slanke wikke heeft geveerde bladen met meestal twee of drie paar lijnvormige, tot 2,5 cm lange deelblaadjes met een spitse top. De bovenste bladen met vier tot acht deelblaadjes.

Vierzadige wikke met meestal vier paar langwerpig-lijnvormige, 0,5-2 cm lange deelblaadjes. De bovenste bladen met zes tot zestien deelblaadjes.

Bloeiwijze: Slanke wikke heeft een langgesteelde tros met één tot vijf, blauwachtig witte of lichtroze bloemen met 6-9 mm lange kroonbladen. Vierzadige wikke heeft ijle trossen met één tot vier, blauwpaarse of blauwachtig witte bloemen met 4-8 mm lange kroonbladen.

Slanke wikke heeft bruine, 0,9-1,7 cm lange, kale peulen met meestal vier tot zes zaden. Vierzadige wikke 0,9-1,6 cm lange peulen met meestal vier zaden.

Groeiplaats: Beide ondersoorten groeien op zonnige, warme, open plaatsen op vochtige, matig voedselrijke, kalkhoudende grond.

Groeiplaatsen zijn o.a. graanakkers, struwelen, heggen, grazige ruigten, spoorbermen, kanaaldijken en bermen.

De planten komen oorspronkelijk uit Zuidwest-Azië, Noord-Afrika en Zuid- en West-Europa.

In Nederland en België is Slanke wikke een zeer zeldzame plant.

Vierzadige wikke is (vrij) algemeen.



Grote ratelaar - *Rhinanthus angustifolius*

Afmeting: 10-80 cm.

Stengels: De rechtopstaande, vierkantige stengels kunnen al dan niet vertakt zijn. Op de stengels zie je korte, zwarte streepjes. Ze zijn niet of maar weinig behaard.

Bladeren: De tegenoverstaande, lijnvormige tot langwerpige-eivormige bladen zijn 2-5 mm breed. Ze zijn getand. De langwerpige schutbladen zijn gezaagd en veel bleker dan de stengelbladen. Bij de Kleine ratelaar zijn de schutbladeren niet bleker. Ze zijn langer dan de kelken en hebben onderaan grote tanden.

Bloemen: Tweeslachtig. De kelk is kaal of alleen aan de rand behaard (de vier kale kelkbladen zijn vergroeid). De 1,6-2 cm grote bloemen zijn geel. Ze zijn zwak naar boven gebogen en de keel is gesloten. De bovenlip heeft twee donker blauwpaarse, zelden bijna witte tanden van ongeveer 2 mm. De stempel komt net buiten de bovenlip uit. De kroonbuis is licht gebogen en behaard. Het vruchtbeginsel is bovenstandig.

